

Recommandations d'utilisation en milieu hospitalier

NutriHope Fibre doit être reconstitué de préférence juste avant consommation. Manipuler le produit avec précaution pour éviter toute contamination pendant la préparation et l'administration.



- 1** Nettoyer et désinfecter le plan de travail, se laver les mains et utiliser des ustensiles et un récipient stérilisés, si possible.



- 2** Faire bouillir de l'eau potable.



- 3** Verser dans un récipient la quantité requise d'eau bouillie refroidie à 60-70 °C pour une reconstitution optimale.



- 4** Dans le récipient, ajouter le nombre requis de dosettes arasées de poudre (voir le "Tableau de reconstitution") : suivre les instructions pour la formulation **Énergie Modérée (EM)** ou **Haute Énergie (HE)** en fonction de la prescription médicale.



- 5** Remettre immédiatement la dosette sèche dans la boîte sans la laver.



- 6** Mélanger énergiquement jusqu'à dissolution complète. Remuer avec un fouet pour une reconstitution optimale ; pour de petites quantités, une fourchette propre peut aussi être utilisée.



- 7** Pour une utilisation entérale par sonde, verser la quantité prescrite de formulation finale reconstituée **EM** ou **HE** dans la poche du patient, étiqueter en conséquence et administrer selon le régime prescrit. Pour une utilisation orale, faire refroidir à température de consommation.



- 8** À consommer de préférence immédiatement après préparation. Si le produit n'est pas consommé immédiatement, couvrir. Une fois reconstitué, utiliser dans les 6 heures à température ambiante pour une utilisation entérale par sonde et dans les 2 heures pour une utilisation orale.



- 9** La formule reconstituée depuis moins de 2 heures peut être stockée au réfrigérateur (5 °C max.) pendant 24 heures maximum. Au-delà de 24 heures, la formule réfrigérée doit être jetée. Si la formule a été réfrigérée, remuez-la avant de la consommer.